






# בחירת הטיפול המקומי לפסוריאזיס

פרטופיק	אלידל	דיטרוקם	זפת	סליציל	אנסטילר קצף / דיבובט משהה / קסמיאול גל		קורטיקוסטרואידים חזקים		קורטיקוסטרואידים בינוניים		קורטיקוסטרואידים חלשים		משך הטיפול	אזור הטיפול
					משהה/גל	קצף	משהה	קרם	משהה	קרם	משהה	קרם		
-	-	++	-	+	++	++	++	+	++	+	-	-	קצר	 גוף וגפיים
-	-	++	+	לסירוגין בלבד	++ ?	++ ?	לסירוגין בלבד	-	לסירוגין בלבד	-	-	-	ארוך	
-	-	-	+ שמפו	++	++	++	++	+	+	-	-	-	קצר	 קרקפת
-	-	-	+ שמפו	לסירוגין בלבד	++ ?	++ ?	לסירוגין בלבד	-	לסירוגין בלבד	-	-	-	ארוך	
-	-	+	-	++	+	++ לא נבדק	++	-	-	-	-	-	קצר	 כפות
-	-	+	-	+	+ ?	++ לא נבדק	לסירוגין בלבד	-	-	-	-	-	ארוך	
++	+	-	-	-	++ גל	++	-	++	-	++	-	++	קצר	 פנים / קפלים / גניטליה
+/-	+/-	-	+	-	++ ?	++ ?	-	-	-	לסירוגין בלבד	-	+/-	ארוך	
-	-	-	-	-	++	לא נבדק	++	-	+	-	-	-	קצר	 ציפורניים
-	-	-	-	-	+/-	לא נבדק	+/-	-	+/-	-	-	-	ארוך	
1-2	0-2	2-4	0-4	2-4	7-8	6-10	4-5	1-3	1-4	1-2	0	1-2	מס' ההתוויות המתאימות לשימוש בתכשיר בודד	
אסור		אסור	אסור	אסור	אסור		הריון / 300 גר <		אין בעיה מעשית				הריון	
-		-	-	-	+ לא בפטמות		++		++		++		הנקה	
+ ללא פוטו באזורים הנמרחים		++	++	++ אחרי ולא לפני	++ אחרי ולא לפני		++		++		++		שילוב עם פוטותרפיה / ים המלח	

קצר - משך הטיפול עד 4 שבועות  
ארוך - משך הטיפול מעל 4 שבועות

++ - מומלץ  
+ - מתאים  
- - אינו מתאים  
+/- - אפשרי, אך ללא מספיק מידע לגבי בטיחות ארוכת טווח  
? - אין מספיק מידע לגבי בטיחות ארוכת טווח במתן רציף