

# מגמות של היארעות פסוריאזיס ודלקת מפרקים פסוריאטית בטאיוואן

גיל מבוגר יותר קשור לעלייה בהיארעות של פסוריאזיס ודלקת מפרקים פסוריאטית

12:34, 21.08.2022 Journal of Clinical Medicine



דלקת מפרקים פסוריאטית היא מחלה כרונית המקושרת לתחלואה גבוהה ואיכות חיים גרועה. עם זאת, מחקרים העוסקים במגמות של היארעות המחלה מונבלים מאוד. לכן, במחקר הנוכחי ניסו החוקרים לבחון מגמות של פסוריאזיס ודלקת מפרקים פסוריאטית בין השנים 2002-2016 בטאיוואן, וכן להבדיל את האפקטים של גיל, התקופה והעוקבה על מגמות אלה.

במסגרת המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Journal of Clinical Medicine ניתחו החוקרים מידע שנאסף ממאגר המידע National Health Insurance Research Database על מנת להעריך את ההיארעות השנתית של פסוריאזיס ודלקת מפרקים פסוריאטית. במסגרת המחקר תכננו החוקרים מודל גיל-תקופה-עוקבה על מנת לחקור את האפקט של כל גיל, תקופה ועוקבת לידה על היארעות המחלות.

תוצאות המחקר הראו כי בין 2002 ו-2016, ההיארעות של פסוריאזיס ירדה באופן מובהק מ-43.33 ל-23.14 מקרים ל-100,000 נפש. לעומת זאת, נמצא כי ההיארעות של דלקת מפרקים פסוריאטית עלתה בין השנים 2002-2016 מ-3.57 ל-5.22 מקרים ל-100,000 נפש. בניתוח מודל הגיל-תקופה-עוקבה, נמצא כי האפקט הנקי של גיל על היארעות פסוריאזיס ודלקת מפרקים פסוריאטית עלה עם הגיל (פי 6 ופי 7.7 הבדל, בהתאמה).

ממודל הגיל-תקופה-עוקבה עולה כי היארעות פסוריאזיס ודלקת מפרקים פסוריאטית קשורה לגיל מבוגר יותר ועוקבות לידה מוקדמות. לפיכך, מטופלים מבוגרים בטאיוואן יכולים להיות בסיכון מוגבר יותר לפתח פסוריאזיס ודלקת מפרקים פסוריאטית.

**מקור:**