


תוצאים הקשורים ל-19-COVID בקרב מטופלים עם פסוריוזיס

רק חישון עם 3 מנוגת כנגד קורונה הפחת תחלואה במטופלים עם פסוריוזיס

13:03, 18.08.2022 Viruses



מחלת ה-19-COVID מהוा איז עלאאנשעם מחלות המתואכות על ידי מערכת החיסון. נראא כי בקרב מטופלים עם פסוריוזיס ישנים שיעורי הדבקה דומים ב-2-SARS-CoV בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. מסורת הממחקר הנוכחי הייתה לזהות גורמים הקשורים לתחלואה ב-19-COVID ולהעריך את חומר המחלה בקרב מטופלים עם פסוריוזיס בהתאם של החיים האמתיים.

במסגרת הממחקר ששמציאו תוארו בכתב העת *Viruses* ערכו החוקרים מחקר חתך כולל 379 משתתפים. כרבע מהמשתתפים (78; 25.8%) אשר סייפקו מידע אודות סטטוס ה-19-COVID שלהם (302 משתתפים) ללקו במחללה.

תוצאות הממחקר הראו כי חב המשתנים אשר נבחנו על מנת להעריך את השפעתם על תחלואה ב-19-COVID לא היו מובהקים סטטיסטי, למעט מצב חינוכי, ניל ומגדר. מחקר זה גם סייפק הוכחות אודות ההננה מפni תוצאי 19-COVID הניתנת בזוכות החיסון, וביחוד לאחר המנה השלישית. עוד נמצא כי מבין כל המשתנים הפטנציאליים, מצוי אכן שאייננו מרומה הנביר את הסיכויים להיות מחוסן לפחות פעם אחת פי 2.6. עוד נמצא כי מטופלים עם מושך פסוריוזיס ארוך יותר היו בעלי סיכויים נבוהים יותר להיות מחוסנים כנגד 2-SARS-CoV. כמו כן, מחקר זה עולה כי טיפול ביולוגי עבור פסוריוזיס הוא בטוח לשימוש במהלך ה-19-COVID וכי חיסון מטופלים היה גורם מוגן מובהק סטטיסטי כנגד תחלואה ב-19-COVID. עם זאת, ראוי לציין כי רק 3 מנוגת חיסון הביאו לירידה מובהקת סטטיסטית בסיכון לליקות במחללה.

מצאי הממחקר הנוכחי דורשים אישור של מחקרים נדולים יותר אך מספקים מידע אודות תוצאי 19-COVID ושיעורי הימצאות המחלה בקרב מטופלים הסובלים מפוסוריוזיס.

מקור: